

## 市疫情防控工作领导小组会议研究部署重点工作 持续完善常态化疫情防控体系

**晨报讯** 市新冠肺炎疫情防控工作领导小组昨天下午召开会议，学习贯彻习近平总书记关于疫情防控工作的重要讲话和重要指示精神，听取近期我市疫情防控总体情况汇报，研究部署下一阶段疫情防控工作重点，持续完善常态化疫情防控体系。市委书记、市疫情防控工作领导小组

组长陈吉宁主持会议并讲话。市委副书记、市长、市疫情防控工作领导小组组长龚正出席会议并讲话。

会议指出，要切实把握思想和行动统一到习近平总书记重要讲话和重要指示精神上，坚定不移坚持人民至上、生命至上，坚定不移落实“外防输入、内防反弹”总

策略，坚定不移贯彻“动态清零”总方针，坚持第九版防控方案、落实二十条优化措施，守土有责、守土尽责，科学精准、扎实推进，把疫情防控各项工作切实做好，更好回应和解决老百姓的关切和需求，最大程度保护人民生命安全和身体健康，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响。

陈吉宁走访民主党派市委和市工商联

## 建睿智之言 谋务实之策

**晨报讯** 中共上海市委书记陈吉宁昨天分别走访民革、民盟、民建、民进、农工党、致公党、九三学社、台盟市委机关和市工商联，看望慰问干部职工，听取大家学习贯彻中共二十大精神，围绕中心、服务大局相关工作情况介绍。陈吉宁指出，要深入学习贯彻中共二十大和习近平总书记考察上

海重要讲话精神，坚守合作初心，胸怀“国之大者”，更好履行职能，最大限度把各方面智慧和力量凝聚起来，最大限度把广大成员的积极性、主动性、创造性发挥出来，为上海加快建设具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市作出更大贡献。

陈吉宁指出，要围绕中共二

十大擘画的宏伟蓝图、确立的奋斗目标作出的战略部署，结合上海超大城市实际，找准工作的着力点和突破口，充分发挥各民主党派和工商联人才荟萃、智力密集、联系广泛的优势，在推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理等方面建睿智之言，谋务实之策。

市政府常务会议昨日召开

## 全力以赴抓好今年收官冲刺

**晨报讯** 市委副书记、市长龚正昨天主持召开市政府常务会议，强调按照市委部署，抓好今年收官冲刺，科学精准谋划明年工作；进一步降低企业制度性交易成本；推动生活性服务业补短板、上水平。会议指出，要全力以赴抓好

今年各项工作收官冲刺。全力争取经济增长最好结果，争取更多指标加快反弹回升。加快推进重大工程重大项目建设，着力推动更多重大项目开工续建。

会议指出，明年是贯彻党的二十大精神的开局之年，也是新

一届政府的起步之年。要科学精准谋划明年及新一届政府的工作思路，在落实中央决策部署上下更大功夫，聚焦习近平总书记交给上海的一系列重大战略任务，准确把握新形势新发展新要求，谋划好重点任务和重大举措。

# 居家健康监测期间 非必要不外出

——国务院联防联控机制新文件看点聚焦

据新华社北京 11 月 21 日电

二十条优化措施出台后，国务院联防联控机制综合组 21 日公布了《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》4 个文件，进一步指导各地各部门做好疫情防控工作。

### 核酸检测怎么开展？

#### 早发现早处置

早发现是及时处置疫情的关键之一。《新冠肺炎疫情防控核酸检测实施办法》在常态化监测和区域核酸检测两方面对各地开展疫情监测工作作出指导。

在常态化监测方面，该办法要求重点机构和场所常态化下应做好相关人员症状监测，可根据当地防控需要组织开展核酸抽检。辖区内出现 1 例及以上本土疫情后，应及时组织完成 1 次全员核酸检测，后续可根据检测结果及疫情扩散风险或辖区检测要求开展核酸检测。

同时，医疗机构对所有发热患者、不明原因肺炎和住院患者中严重急性呼吸道感染感染病例、所有新入院患者及其陪护人员等开展核酸检测。

在区域核酸检测方面，该办法要求疫情处置过程中，在流行病学调查基础上，根据疫情发生地区人口规模大小、感染来源是否明确、是否存在社区传播风险及传播链是否清晰等因素综合研判，根据风险大小，按照分级分类的原则，确定检测人群的范围、频次和先后顺序。

根据该办法，省会城市和千万级人口以上城市疫情发生后，经流调研判，传播链不清、风险场所和风险人员多、风险人员流动性大，疫情存在扩散风险时，疫情所在区每日开展 1 次全员核酸检测，连续 3 次核酸检测无社会面感染者后，间隔 3 天再开展 1 次全员核酸检测，无社会面感染者可停止全员核酸检测。

### 不同风险区域怎么管？

#### 实施分类管理措施

二十条优化措施将风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类。不同风险区域划定的标准是什么？分别需要采取哪些防控措施？

根据《新冠肺炎疫情风险区划定及管控方案》，一旦发生本土疫情，要尽早将病例和无症状感染者所在县（市、区、旗）精准划分为高风险区、低风险区两类风险区，统筹各方面力量，实施分类管理措施。

该方案明确，原则上将感染者居住地，以及活动频繁且疫情传播风险较高的工作地和活动地等区域，划为高风险区。高风险区实行封控措施，期间“足不出户、上门服务”。封控期间发现新的感染者，由当地联防联控机制组织开展风险研判，按照“一区一策”要求，可将原封控区域全部或部分延长封控时间。

该方案明确，高风险区连续 5 天未发现新增感染者，且第 5 天风

险区域内所有人员完成一轮核酸检测均为阴性，降为低风险区。符合解封条件的高风险区要及时解封。

高风险区所在县（市、区、旗）的其他地区划定为低风险区。实行“个人防护、避免聚集”，离开所在城市持 48 小时内核酸检测阴性证明。此外，所有高风险区解除后，县（市、区、旗）全域实施常态化防控措施。

根据该方案，疫情处置过程中，如个别病例和无症状感染者对居住地、工作地、活动区域造成的传播风险较低，密切接触者已及时管控，经研判无社区传播风险，可不划定风险区；未发生本土疫情的县（市、区、旗），要切实落实常态化疫情防控各项措施，无需划定风险区。

### 居家隔离怎么做？

#### 期间赋码管理

哪些人需要居家隔离医学观察？居家隔离医学观察者有哪些自我管理要求？

《新冠肺炎疫情居家隔离医学观察指南》明确，管理对象包括密切接触者中的特殊人群、解除集中隔离后的密切接触者和入境人员、高风险区外溢人员及其他经专业人员评估无法进行集中隔离医学观察的人员。

根据该指南，居家隔离医学观察者应当每天早、晚各进行 1 次体温测量和自我健康监测，并将监测结果主动报告至社区医学观察管理人员。居家隔离期间赋码管理，居家隔离人员严格做到不外出，拒绝一切探访。对因就医等确需外出人员，经所在社区医学观察管理人员批准后方可外出，安排专人专车，全程做好个人防护，落实闭环管理。

其中，非单独居住者，其日常生活、用餐尽量限制在隔离房间内，其他人员不进入隔离房间。隔离房间内活动可不戴口罩，离开隔离房间时要戴口罩。尽量减少与其他家庭成员接触，必须接触时保持 1 米以上距离，规范佩戴医用外科口罩。

根据该指南，居家隔离医学观察人员需根据相关防控要求配合工作人员完成核酸检测、抗原自测和结果上报。

### 居家健康监测怎么做？

#### 非必要不外出

哪些人需要居家健康监测？居家健康监测人员有哪些管理要求？

《新冠肺炎疫情居家健康监测指南》明确，适用对象为结束闭环作业的高风险岗位从业人员、新冠肺炎感染者出院（舱）人员及其他经专业人员评估需进行居家健康监测的人员。

根据该指南，实行居家健康监测人员每日早晚各测量 1 次体温，做好症状监测，并向社区（村）如实报告。居家健康监测期间，本人要严格落实非必要不外出，如就医等特殊情况下外出时做好个人防护，规范佩戴 N95/KN95 颗粒物防护口罩，避免乘坐公共交通工具。同时，需根据防控要求配合完成核酸检测。



**中国农业银行**  
AGRICULTURAL BANK OF CHINA

中国农业银行传世之宝  
贵金属产品系列  
广告



产品名称	材质	规格
传世之宝兔年生肖金条 (第二轮)	Au99.99	20g、60g、100g、200g、500g

中国农业银行监制发行 图片仅为示意 最终以实物为准  
更多产品详情，请咨询农业银行各网点  
投资有风险，交易需谨慎